

The effect of *Azospirillum lipoferum*, *A. brasilense* and *Bacillus subtilis* bacteria on biological control of *Pythium ultimum*

Mohammad Reza Shirafkan¹, Samira Shahbazi²(ORCID: 0000000282913887), Mohammad Ali Ebrahimi³, Hamid Sobhanian⁴

1. Department of Biology, Faculty of Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2. Department of Plant Pathology, Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Alborz, Iran.

3. Department of Biotechnology, Payame Noor University, Tehran, Iran. & Systems Biology Research Department, ABRII, Agricultural Research, Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.

Correspondence

Samira Shahbazi

Email: sshabbazi@aeoi.org.ir

Received: 2, Mar. 2024

Accepted: 19, Jun. 2024

How to cite:

Shirafkan, M.R., Shahbazi, S., Ebrahimi, M.A. & Sobhanian, H. (2024). The effect of *Azospirillum lipoferum*, *A. brasilense* and *Bacillus subtilis* bacteria on biological control of *Pythium ultimum*. *Crop Biotechnology*, 14(2), 51-68. (DOI: [10.30473/cb.2024.70671.1960](https://doi.org/10.30473/cb.2024.70671.1960))

ABSTRACT

Growth-promoting bacteria or plant probiotics are an effective part of biocompatible and sustainable agriculture. In this study, changes in some vegetative and plant physiological indicators and the biocontrol of *P. ultimum* (damping-off disease agent) in Lettuce plants treated with two types of growth stimulating bacteria (*A. lipoferum* and *A. brasilense*) and a biocontrol species (*B. subtilis* and two gamma irradiated mutant isolates 419 and 600) were investigated in greenhouse conditions in the form of a completely randomized design (CRD) with four replications. The results showed bacterial treatments in the all growth and physiological indicators, were significantly different from the control at the 5% level. In the *P. ultimum* inoculated treatments, the damping-off and diseases severity (DI) were significantly reduced as a result of the treatment with *B. subtilis* mutants obtained from gamma ray irradiation, but *Azospirillum* strains were not effective in biocontrol. The comparison of physiological indexes in infected plants showed that peroxidase, polyphenol oxidase enzymes and proline increased and malonaldehyde decreased as a result of treatment with *B. subtilis* mutants. From the total results of this research, it can be concluded that the induction of mutation with gamma ray due to the improvement of antagonistic potential of *B. subtilis* led to increase the biological control activities of *B. subtilis* mutants without adverse effects on the growth and physiology of lettuce, so that the efficiency of these mutants in the biocontrol of pseudo-fungus *P. ultimum* and induction of physiological indicators of resistance in the lettuce plant is higher than that of *Azospirillum* efficiency.

KEYWORDS

Pythium ultimum, *Azospirillum lipoferum*, *Azospirillum brasilense*, *Bacillus subtilis*, Biological control.



مقدمه

استفاده از مواد شیمیایی برای کنترل بیماری‌های خاکبرد به دلیل پیچیدگی اکوسیستم خاک؛ احتمال جذب این مواد در کلونیدهای خاک؛ تأثیر متابولیت سایر میکروارگانیسم‌ها و تجزیه و غیرفعال شدن ترکیبات شیمیایی کارایی پایین تری در مقایسه با کاربرد سموم شیمیایی علیه بیماری‌های هوازاد دارد. بنابراین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از دزهای بالاتر سموم علیه بیماری‌های خاکبرد استفاده می‌کنند تا کارایی مورد نظر تأمین شود و همین امر به بروز آلودگی منابع آب و خاک می‌انجامد. برای جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، در برنامه‌های مدیریت تلفیقی بیماری‌های خاکبرد می‌توان تیمار خاک با ترکیباتی که ماده مؤثره زیستی (مانند باکتری *B. subtilis*) دارند را جایگزین ترکیبات شیمیایی کرد (Rostaminia et al., 2021). افزایش کارایی جزءزیستی از راهکارهای مهم ارائه ترکیبات زیستی جایگزین برای کنترل بیماری‌ها به‌منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی است. یکی از راهکارهای افزایش کارایی جزءزیستی، ارتقای قدرت آنتاگونیستی در جزءزیستی است (Afsharmanesh et al., 2014). باکتری‌های محرک رشد گیاهی (PGPRs)، گروهی از میکروبیوم‌های مرتبط با گیاه هستند که تأثیری مفید در بهبود تحمل به تنش‌های زیستی و غیرزیستی دارند. این باکتری‌ها به جذب مواد مغذی توسط گیاهان کمک کرده و ارتقاء سلامت گیاه از تأثیرات آنهاست. بیشتر جنس‌های PGPR شامل سودوموناس، آئروموناس، کلبسیلا، آزوآرکوس، انتروباکتر، آزوسپیریوم، کلسترییدیوم، آروتوباکتر، آرتوباکتر، ریزوبیوم، گلوکوناستوباکتر و باسیلوس‌ها هستند (Rezalu et al., 2022). کاهو با نام علمی (*Lactuca sativa*) جزء خانواده آستراسه و از سبزیجات برگ‌برگی است. منبع غذایی کم‌کالری و مغذی متشکل از مواد معدنی و ویتامین دارد و به‌دلیل شکل مصرف به‌صورت تازه، تولید آن بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی صورت می‌گیرد. تأثیر باکتری‌های محرک رشد مانند *Bacillus* و *Azospirillum* به‌منظور افزایش

جوانه‌زنی بذر و تحریک رشد کاهو تأیید شده است (Rezalu et al., 2022). از آنجایی که کاشت کاهو معمولاً به‌صورت نشاءکاری است، در صورت آلودگی به شبه‌قارچ *P. ultimum* در مرحله نشاءکاری و بروز مرگ گیاهچه (بوتهمیری) خسارت بالاتری به کاهو وارد می‌شود. این تحقیق کارایی دو سویه باکتری *A. brasilense* و *A. lipoferum* (که به عنوان محرک رشد شناخته می‌شوند) و دو موتانت باکتری *B. subtilis* (سویه‌های شماره‌های چهارصد و نوزده و ششصد حاصل از القای جهش با پرتوتابی در ژنوم سویه والد که دارای توانایی آنتاگونیستی هستند) را با دو هدف مورد مطالعه قرار داده است: الف) بررسی کارایی این سویه‌های باکتریایی در کاهش بروز آلودگی گیاهچه کاهو به شبه‌قارچ *P. ultimum*؛ ب) بررسی امکان استفاده از روش القاء جهش در ژنوم باکتری *Bacillus* با پرتو گاما به منظور افزایش قدرت آنتاگونیستی آن علیه *P. ultimum* و بررسی اثرات جانبی تیمار با باکتری موتانت بر برخی شاخص‌های رشد و فیزیولوژی کاهو.

پیشینه پژوهش

شبه‌قارچ *P. ultimum* از مخرب‌ترین بیمارگرهای خاکزاد گیاهی و محدودکننده تولید کاهو در سراسر دنیا است که به میکروارگانیسم‌های شبه‌قارچی (اوومیسیت) تعلق دارد. این شبه‌قارچ به‌صورت پوده‌زی در خاک فعال می‌ماند و قادر است از راه خاک، نشاء آلوده، بقایای گیاهی و آب آبیاری انتقال یابد. این بیمارگر شبه‌قارچی، با تولید کیسه اسپوری (اسپورانژیوم) که هر یک حاوی صدها زئوسپور است، منتشر می‌شود. زئوسپورها پس از رسیدن به سطح ریشه و سیستی‌شدن، جوانه زده و به بافت ریشه با تولید میسیلیوم‌های آلوده‌گر، رخنه می‌کنند. نشانه‌های بروز آلودگی با این بیمارگر در کاهو براساس زمان بروز آلودگی ممکن است به‌صورت مرگ گیاهچه (آلوده‌شدن در مرحله نشاء) یا بروز پوسیدگی طوقه و ریشه (آلوده‌شدن در مراحل استقرار گیاه در گلخانه و مزرعه) بروز نماید (Amaradasa et al., 2024). مرگ گیاهچه می‌تواند پیش از خروج گیاهچه از خاک یا پس از

بدون بیمارگر در تیمار با سویه‌های موتانت و والد *B. subtilis* مقایسه گردید.

روش‌شناسی پژوهش

سویه‌های باکتری *Bacillus subtilis* و موتانت‌های شماره چهارصدونوزده و شش صد حاصل از آن که با استفاده از تکنیک القاء جهش تصادفی حاصل از پرتوی گاما تولید شده‌اند (Afsharmanesh et al., 2014) از کلکسیون میکروبی آزمایشگاه بیماری‌شناسی گیاهی (گروه گیاه‌پزشکی - پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای - پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای) دریافت شدند. جدایه پرآزار شبه‌قارچ *P. ultimum* نیز از کلکسیون میکروبی آزمایشگاه بیماری‌شناسی گیاهی (گروه بیماری‌شناسی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه تربیت مدرس) دریافت شد. بررسی توانایی ممانعت از رشد سویه والد (پرتونیدیه) باکتری *B. subtilis* و موتانت‌های آن با استفاده از روش محمدی و همکاران انجام شد و توانایی بیوکنترل هر دو موتانت و سویه والد باکتری به اثبات رسید (Mohamady et al., 2017). نشاء‌های سالم واریته پرمصرف کاهوی پیچ بلند آمریکایی از شرکت بهاران (شهرستان قزوین) تهیه و در شرایط گلخانه‌ای (دمای ۲۰ تا ۲۲ درجه سلسیوس و نسبت نور به تاریکی ۱۶:۸ و رطوبت ۸۵٪) کشت شد. خاک گلدان‌های ۴ کیلویی با ترکیب ۵۰٪ خاک مزرعه (شنی - لومی) و ۵۰٪ پیت‌ماس پر شد. pH خاک گلدان حدود ۶/۶ تنظیم و خاک همه گلدان‌ها به‌منظور حذف فاکتورهای ارگانیک در ارزیابی‌ها، نخست با اتوکلاو استریل شده؛ سپس با عوامل باکتریایی و قارچی تلقیح شد.

تیمار با سویه‌های محرک رشد: دو کودزیستی با فرمولاسیون مایع، هر کدام حاوی گونه‌های *Azospirillum lipoferum* و *A. brasilense* از مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور تهیه و برای ارزیابی گلخانه‌ای استفاده شد. ۱۰ میلی‌لیتر از کودزیستی مایع برای هر یک از باکتری‌ها، در هر گلدان (سه‌بار طی رشد از مرحله سه برگی نشاء‌ها با فواصل سه‌هفته‌ای تا قبل از تشکیل ساقه گل بر روی بوته) طبق توصیه درج‌شده بر روی بسته‌بندی استفاده شد.

آن ظاهر شود و خسارت شدیدی وارد آورد. مؤثرترین راهکار برای مدیریت آلودگی با شبه‌قارچ، کنترل اینوکولوم بیمارگر در خاک است. این نوع کنترل را می‌توان با استفاده ضد عفونی خاک با سموم شیمیایی یا آفتاب‌دهی (به شرط غنی کردن بستر کاشت یا خاک گلخانه به‌ویژه پس از ضد عفونی) یا با استفاده از عوامل کنترل‌زیستی انجام داد. *B. subtilis* به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص، از قبیل تولید ترکیبات آنتی‌بیوتیکی ضد قارچی به‌ویژه ایتورین و آنزیم‌های هیدرولیتیک و توانایی تولید اسپور پایدار، عامل کنترل‌زیستی موفق علیه بیماری‌های گیاهی است (Constantinescu et al., 2010). مطالعات نشان داده است باکتری‌های محرک رشد مانند *Azospirillum*، اگرچه فعالیت آنتاگونیستی بالایی ندارند، با افزایش حلالیت و قابلیت جذب عناصر ماکرو و میکروالمنت توسط گیاه، می‌توانند موجب بهبود بنیه و رشد گیاه و سیستم ریشه‌ای شده و گیاه را در برابر عوامل بیماری‌زا مقاوم کنند (Yasari and Patwardhan, 2007).

باتوجه به اهمیت شناسایی عوامل زیستی مؤثر در تدوین برنامه‌های کنترل زیستی بیماری‌ها و کاهش مصرف سموم شیمیایی در محصولات تازه‌خوری مانند کاهو، مطالعه حاضر با هدف مقایسه کارایی سویه‌های محرک رشد *Azospirillum* و سویه آنتاگونیست *B. subtilis* بر میزان کاهش بروز علائم ناشی از بیمارگر *P. ultimum* انجام شد. همچنین تأثیر تیمار با این باکتری‌ها بر گیاهچه‌های کاهو از طریق اندازه‌گیری مؤلفه‌های رویشی و فیزیولوژیکی، تحت تنش زیستی با بیمارگر *P. ultimum* و شرایط عادی (بدون بیمارگر) مقایسه شد. با توجه به مشاهده کارایی بهتر سویه *B. subtilis* در مهار زیستی *P. ultimum* تأثیر القاء جهش با پرتو گاما در اصلاح ژنتیکی و بهبود کارایی گونه‌های *B. subtilis* از طریق مقایسه تیمار با سویه والد و موتانت *B. subtilis* علیه *P. ultimum* در کاهو در شرایط گلخانه بررسی شد و مؤلفه‌های رویشی و فیزیولوژیکی گیاهچه‌های کاهو، تحت تنش زیستی با *P. ultimum* و

اسپکتروفتومتر قرائت شد. همچنین برای محاسبه میزان پروتئین با استفاده از نمودار استاندارد به دست آمده از پروتئین خالص سرم آلبومین گاوی، در محدوده غلظت ۰-۱۰۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه گردید (Rezalouet *al.*, 2024). اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم گاباکول پراکسیداز (*POD*) بر اساس میزان اکسیدشدن گاباکول توسط این آنزیم و در طول موج ۴۷۰ نانومتر محاسبه شد (Altunkaya *et al.*, 2011). فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز با استفاده از بافر فسفات و سوبسترای پیرو گالول انجام شد (Altunkaya *et al.*, 2011). برای اندازه گیری کلروفیل، یک گرم برگ داخل فویل را در نیتروژن مایع انداخته با استون ۸۰٪ عصاره گیری شد. عصاره حاصله مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۸۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. محلول رویی در بالن های حجمی ۲۵ میلی لیتری با استون ۸۰٪ به حجم رسانده شد. محلول حاصل با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج های ۶۴۶، ۶۶۳ و ۴۷۰ نانومتر قرائت و میزان کلروفیل *a* (رابطه ۱) و کلروفیل *b* (رابطه ۲) و کارتنوئید (رابطه ۳) با روابط زیر محاسبه شد:

$$\text{Chlorophyll a (U/g FW)} = \frac{12.25 \text{ Abs } 663\text{nm} - 2.79 \text{ Abs } 646\text{nm}}{\text{رابطه ۱}}$$

$$\text{Chlorophyll b (U/g FW)} = \frac{21.21 \text{ Abs } 646\text{nm} - 5.1 \text{ Abs } 663\text{nm}}{\text{رابطه ۲}}$$

رابطه ۳) Carotenoid = $\frac{1000 \text{ Abs } 470\text{nm} - 1.8 \text{ Chl a} - 85.02 \text{ Chl b}}{198}$
از برگ های تازه برداشت شده هر گلدان برای اندازه گیری پرولین (۰/۵ گرم نمونه برگ) به طور تصادفی نمونه برداری شد و با ۱۰ میلی لیتر اسید سولفوسالیسیلیک ۳٪ هموژن کرده و مدت ۱۵ دقیقه با ۱۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد؛ سپس محلول صاف شده با دو میلی لیتر محلول نین هیدرین و دو میلی لیتر اسید استیک مخلوط و یک ساعت در بن ماری قرارداد تا کاملاً خنک شود. به هر لوله آزمایش چهار میلی لیتر تولوئن اضافه و ۲۰ دقیقه با همزن مغناطیسی مخلوط شد. مایع موجود در لوله آزمایش به دو بخش مجزا تقسیم و میزان جذب بخش رنگی حاوی تولوئن در طول موج ۵۲۰ نانومتر قرائت شد. مقدار پرولین با استفاده از منحنی استاندارد به دست آمده^[۴]. اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی به وسیله تست تیوباریتوریک اسید (*TBA*) با

تیمار با سویه های آتاگونیزست: تیمار هر گلدان (یک بار طی رشد در مرحله سه برگی نشاها) با سویه های باکتری *B. subtilis* و موتانت های آن به میزان ۱۰ میلی لیتر با غلظت ۱۰^۴ (سلول باکتری در هر میلی لیتر) انجام شد. شاخص های رویشی (ارتفاع ریشه و ساقه، حجم ریشه، وزن تر ریشه و ساقه) پیش از تشکیل ساقه گل بر روی بوته اندازه گیری شد. وزن تر به کمک ترازو با دقت ۰/۰۰۱ و ارتفاع توسط خط کش مدرج و برای تعیین حجم ریشه از روش تغییر حجم آب در استوانه مدرج استفاده شد. نمونه ها برای تعیین وزن خشک اندام هوایی و ریشه، مدت ۴۸ ساعت در آون در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد قرار داده شد. قبل از کشت محصول هر گلدان برای ارزیابی میزان کنترل بروز بیماری، با چهار تکرار در هر تیمار به جز شاهد، میزان ۵ گرم اینوکولوم قارچ بیمارگر (کشت ۱۰ روزه میسلیم بر روی بذر شاهدانه دوبار اتو کلاو شده) اضافه شد. درصد بروز مرگ گیاهچه با محاسبه درصد گیاهچه های زنده به صورت درصد محاسبه شد. شاخص شدت بیماری بر حسب درصد از رابطه (۱)، ۳۰ روز پس از کشت نشا، بر اساس مقیاس ۱ تا ۵ از روش اصلاح شده فاتوروس و همکاران محاسبه شده است (Fatouros *et al.*, 2019).

- ۰- گیاهان سالم و بدون هیچ گونه علائم آلودگی.
- ۱- کمتر از ۲۰٪ گیاه آلوده شده و حداقل یک شانکر با ابعاد ۲ میلی متر و نکروز داشته باشد.
- ۲- حدود ۵۰٪ گیاه دارای شانکر تپیک با ابعاد ۲ میلی متر باشد.
- ۳- بیش از ۶۰-۷۵٪ گیاه دارای شانکر تپیک با ابعاد ۲ میلی متر باشد.
- ۴- مرگ گیاهچه پس از سبز شدن از خاک، طول گیاهچه کمتر از ۵ سانتی متر باشد.
- ۵- مرگ گیاهچه قبل از سبز شدن از خاک یا پوسیدگی بذر.

پروتئین محلول به منظور سنجش شاخص های فیزیولوژیکی، از بافت برگ (هر تیمار ۰/۵ گرم نمونه برگ) استخراج گردید. از روش برادفورد برای تعیین غلظت پروتئین استفاده و جذب نمونه ها در طول موج ۵۹۵ نانومتر با


یافته‌های پژوهش

تأثیر تیمارها بر شاخص‌های رویشی

آنالیز واریانس شاخص‌های رویشی اندازه‌گیری شده در گیاه کاهوی تحت تیمار با کود زیستی با فرمولاسیون مایع حاوی گونه‌های *A. lipoferum* و *A. brasilense* اثر تیمار را در سطح ۵٪ معنی‌دار نشان داد. مقایسه میانگین در تمامی شاخص‌ها نیز نشان داد تیمار با دوگونه مذکور در مقایسه با شاهد به‌صورت معنی‌داری بالاتر بوده است. شکل زیر شاهد این مدعاست.


همان‌طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود شاخص‌های رویشی (طول بوته، وزن خشک اندام هوایی و ریشه و حجم ریشه) بین دو نوع باکتری تفاوت معنی‌داری نداشت؛ اما در تمام شاخص‌ها تیمار با *A. lipoferum* تفاوت معنی‌داری با شاهد داشت و می‌توان به این نتیجه رسید که این سویه باکتری همزیست *A. lipoferum* کارایی بهتری در افزایش رشد بوته در مقایسه با *A. brasilense* از خود نشان داده است.

سنجش میزان مالون‌دی‌آلدئید انجام شد. مقدار ۰/۵ گرم بافت تر برگ و ریشه در ۵ میلی‌لیتر تری‌کلرواستیک اسید (TCA) ۱٪ همگن شده؛ آنگاه عصاره حاصل به فالکون انتقال یافته و مدت ۵ دقیقه در ۶۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ گشت. مقدار چهار میلی‌لیتر تری‌کلرواستیک اسید ۲۰٪ حاوی ۰/۵٪ تیوباربیتریک اسید به یک میلی‌لیتر از محلول رویی اضافه شد. مخلوط فوق مدت ۳۰ دقیقه در حمام آب گرم (۹۵ درجه سانتیگراد) انکوبه و بلافاصله در حمام یخ، سرد و با سرعت ۶۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گشت. میزان جذب مایع رویی در طول موج ۵۳۲ نانومتر قرائت و جذب ناویژه در ۶۰۰ نانومتر از آن کسر شد. غلظت مالون‌دی‌آلدئید با استفاده از ضریب تصحیح ۰/۱۵۵ محاسبه و طبق واحد میکرومول بر گرم، وزن تر برگ ($\mu\text{mol g}^{-1} \text{FW}$) محاسبه و ارائه گردید. خوانش‌ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل GENWAY ۶۳۱۵ انجام شد. آزمایشات با چهار تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام و داده‌های آن با نرم‌افزار SPSS Var. 13 تجزیه شد. مقایسه میانگین‌ها با آزمون چنددامنه‌ای دانکن با سطح احتمال ۵٪ صورت گرفت.



شکل ۱. مقایسه ویژگی‌های رویشی گیاه کاهوی تحت تیمار با سویه‌های *A. lipoferum* و *A. brasilense* با شاهد. *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum*، *A. brasilense*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense*، Control: گیاه شاهد (بدون تیمار)، *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیمارگر پی‌تی‌اوم، *A. lipoferum* + *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیمارگر. (حروف انگلیسی *A. lipoferum* و بیمارگر، *A. brasilense* + *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر. (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستون‌ها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 3. Comparison of vegetative characteristics of lettuce plants treated with *P. ultimum*, *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains with the control; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum*; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense*; Control: control plant without pathogen treatment; and *P. ultimum*: plants treated with pathogen; *A. lipoferum* + *P. ultimum*: plants treated with *A. lipoferum* and *P. ultimum*; *A. brasilense* + *P. ultimum*: plants treated with *A. brasilense* and *P. ultimum*. (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).



شکل ۲. مقایسه ویژگی‌های رویشی گیاه کاهوی تلقیح‌شده با اینوکولوم فعال *P. ultimum*، تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis*. *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد، *B.s.M600*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد، *B.s.M419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده، *Control*: گیاه شاهد (بدون تیمار) و *P.ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیمارگر، *B.subtilis+P.ultimum*: گیاهان تیمار شده با باکتری باسیلوس والد و بیمارگر، *B.s.M600+P.ultimum* گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد و بیمارگر، *B.s.M419+P.ultimum* گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده و بیمارگر (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستونها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 2. Comparison of vegetative characteristics of lettuce plants treated with *P. ultimum*, wild type and mutants of *B. subtilis* with the control; *B.subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis*; B. sM600: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis*; B. Sm419: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis*; Control: control plant without treatment; *P. ultimum*: plants treated with pathogen; *B.subtilis+P.ultimum*: plants treated with wild type *B. subtilis* and *P.ultimum*; B. sM600+: *P.ultimum* plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and *P. ultimum*; BsM419+ *P.ultimum*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and *P. ultimum*. (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).

خشک ریشه نیز همانند حجم ریشه بود. تیمار با سویه والد و موتانت شماره چهارصدونوزده با شاهد سالم تفاوت معنی‌داری نداشت؛ اما تیمار با سویه *B. subtilis* موتانت شماره شش صد به‌طور معنی‌داری در سطح ۵٪ به‌طور معنی‌داری بالاتر از کنترل بود. میانگین داده‌های وزن خشک اندام هوایی مشابه با شاخص وزن خشک ریشه بودند. در شاخص ارتفاع اندام هوایی بین تیمارها و شاهد سالم تفاوت معنی‌دار نبود و فقط گیاهان بیمار به‌طور معنی‌داری ارتفاع کمتری داشتند. بین تیمار با سویه باکتری والد و موتانت‌های آن در شرایط آلودگی با بیمارگر و بدون بیمارگر، از نظر شاخص‌های رشد تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد؛ اما بالاتر بودن میانگین شاخص‌های رشد در تیمار با انواع *B. subtilis* در مقایسه با شاهد، توانایی کنترل‌زیستی *B. subtilis* والد و موتانت‌های آن را

در شکل بالا، آنالیز واریانس ویژگی‌های رویشی اندازه‌گیری شده در گیاه کاهوی تلقیح‌شده با اینوکولوم فعال *P. ultimum*، تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* در سطح ۵٪ اثر متقابل تیمار با شبه‌قارچ بیمارگر و باکتری‌های آنتاگونیست معنی‌دار را نشان داد. مقایسه میانگین در شاخص حجم ریشه نیز نشان داد تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* در سطح ۵٪ به‌طور معنی‌داری باعث توسعه و رشد ریشه شده و از بروز علائم توقف رشد ناشی از آلودگی به شبه‌قارچ پی‌تی‌اوم در ریشه ممانعت نموده است؛ تاجایی که با حجم ریشه گیاه شاهد سالم، تفاوت معنی‌داری نداشته است. این مسئله در حالی است که در گیاهان تلقیح‌شده با بیمارگر حجم ریشه به‌طور معنی‌داری پایین‌ترین میزان در تمامی تیمارها بوده است (شکل ۲). روند داده‌ها در شاخص وزن

تیمار با باکتری نیز باعث تولید کمترین میزان وزن خشک کاهو شد.

تأثیر تیمارها بر شاخص‌های کنترل بیولوژیکی

مقایسه درصد مرگ گیاهچه در گیاهان تحت تیمار با *P. ultimum* در شرایط گلخانه‌ای نشان داد اینوکولوم استفاده شده و جدایه بیمارگر کاملاً فعال و پرآزار بوده و بیش از ۸۰٪ مرگ گیاهچه در گیاهان آلوده به بیمارگر و بدون تیمار با باکتری آنتاگونیست بوده است. این نتایج از شدت بالای بروز این علامت در کاهو و حساسیت رقم انتخاب‌شده به بیمارگر حکایت داشت. درصد بروز مرگ گیاهچه در گیاهان تحت تیمار با سویه *B. subtilis* موتانت شماره به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از تیمار با سویه والد و موتانت شماره چهارصدونوزده بود و میزان بروز بوته‌میری در شاهد سالم با این دو تیمار تفاوت معنی‌داری نداشت. داده‌های مذکور، موفقیت این عامل آنتاگونیست در بیوکنترل *P. ultimum* را در شرایط گلخانه‌ای نشان می‌دهد (شکل ۳). اما تیمار با سویه‌های *Azospirillum* نتوانست از بروز بوته‌میری به‌طور معنی‌داری در مقایسه با شاهد ممانعت کند. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از کودهای زیستی، علی‌رغم تأثیر مثبتی که در افزایش شاخص‌های رشد از خود نشان دادند، کارایی مناسبی در کنترل بیماری در صورت بروز آلودگی در مراحل اولیه رشد گیاهچه ندارند.

شدت بروز بیماری در ارزیابی گلخانه‌ای، آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد اثر متقابل باکتری‌های آنتاگونیست و عامل بیماری در سطح ۵٪ در مقایسه با شاهد سالم معنی‌دار بوده و تیمار با آنها بر شدت بروز بیماری تأثیر معنی‌داری داشته است. در گیاهان تلقیح‌شده با شبه‌قارچ *P. ultimum* در شرایط ارزیابی گلخانه‌ای، بالاترین شدت بروز علائم به ثبت رسید که پرآزار بودن جدایه شبه‌قارچ استفاده‌شده و حساسیت واریته میزبان را تأیید نمود. میزان شدت علائم در گیاهان تحت تیمار در سطح ۵٪ با سویه موتانت‌های *B. subtilis* موتانت شش‌صد تفاوت معنی‌داری با سویه والد و موتانت چهارصدونوزده نداشت؛ اما کلیه تیمارها با باکتری‌های آنتاگونیست به‌طور معنی‌داری با شاهد سالم تفاوت داشتند.

به‌منظور جلوگیری از بروز علائم نشان داد. تلقیح گیاه با بیمارگر، پایین‌ترین عملکرد را در گیاهان بیمار نشان داد، در تیمار با *B. subtilis* موتانت شش‌صد نیز تفاوت معنی‌داری با شاهد یا باکتری *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده و والد آن دیده شد. این مسئله نشان می‌دهد تأثیر این موتانت در بهبود عملکرد گیاه در شرایط بروز بیماری نیز بهتر از سویه والد یا موتانت شماره چهارصدونوزده بوده است.

عملکرد گیاهان تحت تیمار با *A. lipoferum* در شرایط تلقیح با بیمارگر به‌طور معنی‌داری بهتر از گیاهان تحت تیمار با *A. brasilense* بود. به‌طور کلی در تمامی تیمارها، بهبود شاخص عملکرد بوته در مقایسه با شاهد سالم تفاوت معنی‌داری نشان داد که از تأثیر مثبت همه سویه‌های باکتری استفاده‌شده در تیمارها حکایت داشت. اثر تیمارهای آزمایش دو باکتری *B. subtilis* و *Azospirillum* با احتمال ۵٪ بر ارتفاع گیاه کاهو معنی‌دار بود. شکل ۲ و ۱ شاهد این مدعا هستند. بیشترین ارتفاع گیاه در شرایط عدم تلقیح با قارچ پی‌تی‌اوم در تیمار *B. subtilis* موتانت شماره شش‌صد با گیاهان تحت تیمار با *A. brasilense* و *A. lipoferum* بود؛ اما تیمار با دو باکتری *B. subtilis* والد و *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشتند. این مسئله، کارایی بهتر *Azospirillum* در القاء رشد در کاهو در مقایسه با *B. subtilis* نشان می‌دهد.


تلقیح با قارچ پی‌تی‌اوم و تیمار با باکتری *B. subtilis* والد نیز به‌طور معنی‌داری کارایی بهتری از تیمار با سایر باکتری‌ها داشت. بوته در گیاهان تلقیح‌شده با قارچ پی‌تی‌اوم و در شرایط بدون بیمارگر، در تیمار شاهد و *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده، کمترین ارتفاع را داشت. مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک کاهو نشان داد وزن خشک در شرایط تلقیح/عدم تلقیح با قارچ پی‌تی‌اوم در *A. lipoferum*، بیشترین میزان را داشت. کمترین میزان وزن خشک در شرایط عدم تلقیح با قارچ پی‌تی‌اوم در تیمار شاهد به‌دست آمد که تأثیر مثبت کلیه باکتری‌ها در افزایش رشد را نشان می‌دهد. تلقیح با بیمارگر در تیمار با *B. subtilis* والد و هر دو موتانت، کمترین میزان وزن خشک، حاصل آن بود. تلقیح بیمارگر در شرایط عدم

در برگ کاهو بین تیمارها و شاهد وجود دارد؛ و تیمارهای *B. subtilis* والد پرتوندیده و دو موتانت منتخب، باعث افزایش معنی دار تجمع پروتئین محلول در برگ کاهو نسبت به شاهد شده است. از این رو، بالاترین میزان تجمع پروتئین در گیاهان کاهوی تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده اندازه گیری شد. در گیاهان تحت تیمار با بیمارگر تفاوت معنی داری با شاهد مشاهده نشد؛ اما در گیاهان تحت تیمار با بیمارگر با استفاده از باکتری *B. subtilis* والد و آروسپرلیوم، توانست به افزایش بیان و تجمع پروتئین در بافت کمک کند. بیشترین میزان پروتئین برگ در گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و کمترین میزان در گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد مشاهده شد. بین تیمار با باکتری باسیلوس موتانت در شرایط بیماری و بدون بیماری اختلاف معنی داری وجود نداشت. این موضوع را می توان در شکل ۵ به وضوح دریافت.

باتوجه به شکل ۴ دوسویه باکتری های همزیست *A. lipoferum* و *A. brasilense* از نظر شدت بروز بیماری تفاوت معنی داری با شاهد آوده به *P. ultimum* نداشتند؛ از سوی دیگر با میزان شدت بیماری ظهور یافته در گیاهان تحت تیمار با بیمارگر و *B. subtilis* والد نیز تفاوت نداشتند. این نتایج نشان داد کارایی دوسویه باکتری همزیست *A. lipoferum* و *A. brasilense* به طور معنی داری در شاخص میزان شدت بروز بیماری، پایین تر از موتانت های *B. subtilis* است. این مسئله ممکن است به دلیل عدم فعالیت آنتاگونیستی مؤثر این سویه ها علیه بیمارگر و نیز پرآزار بودن سویه بیمارگر مورد استفاده در این ارزیابی گلخانه ای باشد.


تأثیر تیمارها بر شاخص های فیزیولوژیکی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد در سطح احتمال، ۵٪ تفاوت معنی داری در میزان تولید پروتئین محلول




شکل ۳. مقایسه درصد وقوع مرگ گیاهچه ناشی از *P. ultimum* در گیاه کاهوی تحت تیمار با سویه والد و موتانت های *B. subtilis* و سویه های *A. lipoferum* و *A. brasilense* با شاهد. *B. subtilis* گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد و بیمارگر، *B.sM600* گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد و بیمارگر، *B.sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده و بیمارگر، *A. lipoferum* گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیمارگر، *A. brasilense* گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *P. ultimum* گیاهان تیمار شده با بیمارگر. (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستونها، اختلاف معنی دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می دهد).

Figure 3. Comparison of the of seedling damping off percentage caused by *P. ultimum* in lettuce plants treated with *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* with the control. *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *BsM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; Control: control plant without pathogen treatment and *P. ultimum*: plants treated with pathogen (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).



شکل ۴. مقایسه شدت بروز بیماری ناشی از *P. ultimum* در گیاه کاهوی تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* و سویه‌های *A. brasilense* و *A. lipoferum* با شاهد. *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد و بیمارگر، *B.sM600* گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد و بیمارگر، *B.sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده و بیمارگر، *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیمارگر، *A. brasilense*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *Control*: گیاه شاهد (بدون تیمار با بیمارگر) و *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیمارگر. (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستون‌ها، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 4. Comparison of the of diseases severity caused by *P. ultimum* in lettuce plants treated with *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* with the control. *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *BsM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *Control*: control plant without pathogen treatment and *P. ultimum*: plants treated with pathogen. (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).




شکل ۵. مقایسه پروتئین کل (میلی گرم پروتئین به ازای هر گرم وزن تر گیاه) در برگ کاهو با اینوکولوم فعال *P. ultimum* تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* و سویه‌های *A. lipoferum* و *A. brasilense* و شاهد. *Control*: گیاه شاهد (بدون تیمار); *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد، *B.sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده، *B.sM600*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد، *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum*، *A. brasilense*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *B.s+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد و بیمارگر، *B.sM419+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده و بیمارگر، *B.sM600+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد و بیمارگر، *Ab+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *Al+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیمارگر و *P.ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیمارگر (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستون‌ها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 5. Comparison of Total protein (mg/g fw) of lettuce leaves treated with *P. ultimum*, *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* and control; *Control*: control plant without treatment; *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis*; *B. sM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis*; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis*; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *B. s+P*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *BsM419+P*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600+P*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *A. l+P*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. b+P*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *P. ultimum*: plants treated with pathogen (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).

نشان داد. میزان کلروفیل *b* نیز فقط در همان تیمار افزایش یافت و در سایر موارد تغییری نداشت. میزان کارتنوئید نیز در تیمار با موتانت چهارصدونوزده *B. subtilis* و پی‌تی‌اوم افزایش یافت و تفاوت معنی‌داری با شاهد داشت.

میزان کارتنوئید بین گیاه شاهد و گیاهان بیمار تحت تیمار با باکتری *Azospirillum* تفاوت معنی‌داری نداشت و تنها *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده به‌طور معنی‌داری میزان کارتنوئید بالاتر از شاهد را نشان داد. در شرایط عدم آلودگی با بیمارگر، رنگدانه در کلیه تیمار گیاه با باکتری‌ها به‌طور معنی‌داری بالاتر از شاهد بود (شکل ۶).

اندازه‌گیری میزان محتوای رنگدانه‌ها (کلروفیل و کارتنوئید) در شرایط عدم تلقیح با *P. ultimum*، میزان کلروفیل *a* در گیاه تیمار شده با *B. subtilis* والد و هر دو موتانت آن و دو سویه باکتری *A. brasilense* و *A. lipoferum* نشان می‌دهد افزایش معنی‌داری در مقایسه با شاهد یافته است. کلروفیل *b* و کارتنوئید هم در همین شرایط نسبت به شاهد، افزایش نشان می‌دهد. میزان کلروفیل *a* در تیمار گیاه با *B. subtilis* والد و موتانت شش‌صد و دو سویه *A. brasilense* و *A. lipoferum* در شرایط تلقیح با *P. ultimum* تغییری نشان نداد و در واقع، تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشت؛ فقط در تیمار با موتانت چهارصدونوزده *B. subtilis* و پی‌تی‌اوم، افزایش



شکل ۶. مقایسه کلروفیل *a* کلروفیل *b* و کارتنوئید (میکروگرم رنگدانه به ازای هر گرم وزن تر برگ) در برگ کاهو با اینوکولوم فعال *P. ultimum* تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* و سویه‌های *A. lipoferum* و *A. brasilense* و شاهد. Control: گیاه شاهد (بدون تیمار); *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد، *B. sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده، *B. sM600*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش‌صد، *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense*، *A. lipoferum*، *A. brasilense* تیمار شده با باکتری *A. brasilense*، *B. s+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد و بیمارگر، *B. sM419+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده و بیمارگر، *B. sM600+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش‌صد و بیمارگر، *Ab+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *Al+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیمارگر و *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیمارگر (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستون‌ها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 6. Comparison of Chlorophyll a and b and carotenoids ($\mu\text{g/g fw}$) of lettuce leaves treated with *P. ultimum*, *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* and control; Control: control plant without treatment; *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis*; *B. sM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis*; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis*; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *B. s+P*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *BsM419+P*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600+P*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *A. l+P*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. b+P*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *P. ultimum*: plants treated with pathogen (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).


شرایط تلقیح پی‌تی‌اوم و تیمار با *A. lipoferum* مشاهده شد (شکل ۷).

نتایج سنجش فعالیت آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز در شکل ۸، نشان داد در شرایط عدم تلقیح با بیمارگر، تیمار کاهو با *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده بیشترین مقدار افزایش این آنزیم را در برگ گیاه داشته است. کمترین مقدار فعالیت در شاهد و گیاهان تیمار شده با *A. lipoferum* و *A. brasilense* بوده است.

بیشترین میزان فعالیت آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز در شرایط تلقیح بیمارگر در گیاهان تحت تیمار با *B. subtilis* موتانت شش‌صد و کمترین فعالیت این آنزیم در گیاهان تحت تیمار با *B. subtilis* والد مشاهده شد.


نتایج سنجش فعالیت آنزیم پراکسیداز نشان داد در اثر تیمار کاهو با باکتری‌ها در شرایط عدم تلقیح با *P. ultimum* و *B. subtilis* موتانت شش‌صد و *A. lipoferum* آنزیم پراکسیداز افزایش بیشتری داشته است و تفاوت معنی‌داری با شاهد داشتند.

در تیمار با *B. subtilis* والد و موتانت چهارصدونوزده و *A. brasilense* میزان فعالیت پراکسیداز نسبت به شاهد کمتر بود؛ اما در شرایط تلقیح با *P. ultimum*، تیمار با موتانت چهارصدونوزده *B. subtilis* آنزیم پراکسیداز بیشترین افزایش فعالیت را داشت که تفاوت معنی‌داری را با شاهد نشان داد. کمترین مقدار آنزیم پراکسیداز در



شکل ۷. مقایسه فعالیت پراکسیداز (Unit فعالیت آنزیم به ازای هر گرم وزن تر برگ) در برگ کاهو با اینوکولوم فعال *P. ultimum* تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* و سویه‌های *A. lipoferum* و *A. brasilense* و شاهد. Control: گیاه شاهد (بدون تیمار); *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد، *B. sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده، *B. sM600*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش‌صد، *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum*، *A. b+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* والد و بیمارگر، *B. sM419+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده و بیمارگر، *B. sM600+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش‌صد و بیمارگر، *Ab+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *Al+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیمارگر و *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیمارگر (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستون‌ها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 7. Comparison of Peroxidase activity (U/g fw) of lettuce leaves treated with *P. ultimum*, *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* and control; Control: control plant without treatment; *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis*; *B. sM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis*; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis*; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *B. s+P*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *B. sM419+P*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600+P*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *A. l+P*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. b+P*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *P. ultimum*: plants treated with pathogen (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).




شکل ۸. مقایسه فعالیت پلی فنل اکسیداز (Unit فعالیت آنزیم به ازای هر گرم وزن تر برگ) در برگ کاهو با اینوکولوم فعال *P. ultimum* تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* و سویه‌های *A. lipoferum* و *A. brasiliense* و شاهد. Control: گیاه شاهد (بدون تیمار); *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد، *B. sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده، *B. sM600*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش‌صد، *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum*، *A. l+p*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیماری‌گر، *B. s+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد و بیماری‌گر، *B. sM419+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده و بیماری‌گر، *B. sM600+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش‌صد و بیماری‌گر، *Ab+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasiliense* و بیماری‌گر، *Al+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیماری‌گر و *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیماری‌گر (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستونها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 8. Comparison of Polyphenol oxidase activity (U/g fw) of lettuce leaves treated with *P. ultimum*, *A. lipoferum* and *A. brasiliense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* and control; Control: control plant without treatment; *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis*; *B. sM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis*; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis*; *A. brasiliense*: plants treated with *A. brasiliense* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *B. s+P*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *B. sM419+P*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600+P*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *A. l+p*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. b+p*: plants treated with *A. brasiliense* and pathogen; *P. ultimum*: plants treated with pathogen (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).

باکتری *B. subtilis* به تجمع کمترین مقدار مالون‌دی‌آلدئید در بافت انجامید و با توانایی آنتاگونیستی این سویه موتانت منطبق بود (شکل ۹).

سنجش پرولین در بافت برگی در شکل ۱۰ نشان داد تیمار کاهو در شرایط عدم تلقیح با *P. ultimum* با موتانت شش‌صد *B. subtilis* بیشترین مقدار پرولین را داشته و کمترین مقدار در شرایط عدم تلقیح بیماری‌گر، مربوط به *Bacillus subtilis* بوده است. نتایج سنجش پرولین در شرایط تلقیح *Pythium ultimum* و تیمار با *A. lipoferum+P* و *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده بیشترین مقدار پرولین را نشان داد؛ اما تیمار با باکتری *B. subtilis* موتانت شش‌صد به جز گیاه آلوده به *P. ultimum* کمترین میزان پرولین مشاهده شد.

میزان مالون‌دی‌آلدئید با میزان بروز آسیب به غشای سیتوپلاسمی سلول‌ها مرتبط است. بیشترین مقدار آن در گیاهان تلقیح شده با *P. ultimum* مشاهده شد؛ که احتمالاً به دلیل تأثیر نامطلوب بیماری‌گر و ایجاد تنش فیزیولوژیک در سلول بوده است و با داده‌های درصد بروز بیماری (شکل ۳) و شدت بیماری (شکل ۴) در گیاهان تحت تیمار با این شبه‌قارچ تطابق داشت. گیاهان تحت تیمار در شرایط عدم تلقیح با *P. ultimum* نتایج سنجش میزان مالون‌دی‌آلدئید با *A. brasiliense* تفاوت معنی‌داری با گیاهان بیمار نداشتند؛ اما گیاهان تحت تیمار با *A. lipoferum* تفاوت معنی‌داری داشتند؛ اگرچه این دو سویه باکتری همزیست در گیاهان سالم، تفاوت معنی‌داری نشان نداده بودند. این درحالی‌است که در گیاهان سالم، تیمار با موتانت چهارصدونوزده




شکل ۹. مقایسه مالون‌دی‌آلدئید (نانوگرم به ازای هر گرم وزن تر برگ) در برگ کاهو با اینوکولوم فعال *P. ultimum* تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* و سویه‌های *A. brasilense* و *A. lipoferum* و شاهد. Control: گیاه شاهد (بدون تیمار); *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد، *B. sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده، *B. sM600*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد، *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum*، *A. brasilense*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *B. s+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد و بیمارگر، *B. sM419+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده و بیمارگر، *B. sM600+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد و بیمارگر، *Ab+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیمارگر، *Al+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیمارگر و *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیمارگر (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستونها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح $p < 0.05$ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 9. Comparison of Malondialdehyde (ng/g fw) of lettuce leaves treated with *P. ultimum*, *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* and control; Control: control plant without treatment; *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis*; *B. sM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis*; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis*; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *B. s+P*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *BsM419+P*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600+P*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *A. l+p*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. b+P*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *P. ultimum*: plants treated with pathogen (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).

گزارشاتی از تأثیر یک گونه باکتری *Azospirillum* بر افزایش تعداد برگ کاهو منتشر شده که نشان داده تلقیح گیاه ذرت با این نوع باکتری‌های محرک رشد می‌تواند باعث افزایش رشد گیاه شود. نتایج تحقیق یساری و همکارانش نشان داد استفاده از کودهای بیولوژیک حاوی آزوسپریلیوم و ازتوباکتر در کلزا سبب افزایش ارتفاع بوته و وزن خشک و تر اندام هوایی شده است (Yasariet al., 2007). آنها دلیل عمده افزایش وزن خشک برگ ذرت و افزایش وزن تر در تیمار با *A. brasilense* و *P. putida* را قابلیت تولید مواد هورمونی و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط این سویه‌های باکتری همزیست ذکر کرده‌اند (Yasariet al., 2007). تلقیح بذره‌های سیاهدانه نیز با آزوسپریلیوم، ازتوباکتر و سودوموناس فاکتورهای رشد نظیر ارتفاع گیاه را افزایش داده است (Liet al., 2007). فهرست طولانی کاربرد *A. lipoferum* و *A. brasilense* به عنوان تحریک‌کننده رشد در گیاهان مختلف نشان می‌دهد تیمار با این باکتری‌ها می‌تواند برای بهبود رشد و عملکرد گیاهان اثربخش باشد؛ به همین دلیل گزینه مناسبی برای جایگزینی ترکیبات شیمیایی محرک رشد در تولید محصولاتی مانند کاهو است (Utkhedeet al., 2000). نتایج این بررسی، نشان‌دهنده کارایی هر دو سویه مذکور به منظور بهبود شاخص‌های رشد کاهوست.

گزارشاتی از تأثیر یک گونه باکتری *Azospirillum* بر افزایش تعداد برگ کاهو منتشر شده که نشان داده تلقیح گیاه ذرت با این نوع باکتری‌های محرک رشد می‌تواند باعث افزایش رشد گیاه شود. نتایج تحقیق یساری و همکارانش نشان داد استفاده از کودهای بیولوژیک حاوی آزوسپریلیوم و ازتوباکتر در کلزا سبب افزایش ارتفاع بوته و وزن خشک و تر اندام هوایی شده است (Yasariet al., 2007). آنها دلیل عمده افزایش وزن خشک برگ ذرت و افزایش وزن تر در تیمار با *A. brasilense* و *P. putida* را قابلیت تولید مواد هورمونی و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط این سویه‌های باکتری همزیست ذکر کرده‌اند (Yasariet al., 2007).



شکل ۱۰. مقایسه پرولین (میکروگرم به ازای هر گرم وزن تر برگ) در برگ کاهو با اینوکولوم فعال *P. ultimum* تحت تیمار با سویه والد و موتانت‌های *B. subtilis* و سویه‌های *A. lipoferum* و *A. brasilense* و شاهد. Control: گیاه شاهد (بدون تیمار); *B. subtilis*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد، *B. sM419*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده، *B. sM600*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد، *A. lipoferum*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum*، *A. brasilense*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیماری‌گر، *B. s+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* والد و بیماری‌گر، *B. sM419+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شش صد و بیماری‌گر، *B. sM600+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* موتانت شماره چهارصدونوزده و بیماری‌گر، *A. l+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیماری‌گر، *A. b+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* و بیماری‌گر، *Al+P*: گیاهان تیمار شده با باکتری *A. lipoferum* و بیماری‌گر و *P. ultimum*: گیاهان تیمار شده با بیماری‌گر (حروف انگلیسی متفاوت درج شده روی ستونها با رنگ یکسان، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۰/۰۵ بین تیمارها را نشان می‌دهد).

Figure 10. Comparison of Proline (µg/g fw) of lettuce leaves treated with *P. ultimum*, *A. lipoferum* and *A. brasilense* strains and wild type and mutants of *B. subtilis* and control; Control: control plant without treatment; *B. subtilis*: plants treated with wild type *B. subtilis*; *B. sM419*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis*; *B. sM600*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis*; *A. brasilense*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *A. lipoferum*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *B. s+P*: plants treated with wild type *B. subtilis* and pathogen; *BsM419+ P*: plants treated with mutant 419 of *B. subtilis* and pathogen; *B. sM600+P*: plants treated with mutant 600 of *B. subtilis* and pathogen; *A. l+P*: plants treated with *A. lipoferum* and pathogen; *A. b+P*: plants treated with *A. brasilense* and pathogen; *P. ultimum*: plants treated with pathogen (Different letters in each column indicate a statistically significant difference between different isolates $p < 0.05$).

B. subtilis موتانت شش صد پایین‌ترین درصد مرگ گیاهچه را داشتند. مهم اینکه کارایی این موتانت در بیوکنترل این علایم بهتر از تیمار با سویه والد و موتانت چهارصدونوزده است؛ درحالی‌که تیمار با سویه‌های *Azospirillum* نتوانست از بروز بوتهمیری به‌طور معنی‌داری ممانعت کند. به‌عبارت‌دیگر، استفاده از سویه‌های *Azospirillum* با وجود بهبود معنی‌دار شاخص‌های رشد گیاهچه، کارایی مناسبی در کنترل بیماری در صورت بروز آلودگی در مراحل نخستین کاشت نشاء را ندارند. از نظر شاخص شدت علائم، سویه موتانت‌های *B. subtilis* تفاوت معنی‌داری با گیاه آلوده داشتند و توانایی بیوکنترل قابل قبولی را ارائه دادند؛ اما دو سویه باکتری همزیست

گونه *P. ultimum* دارای دامنه میزبانی تقریباً بزرگی است. استفاده از عامل کنترل‌زیستی قارچی و باکتریایی برای کنترل این بیماری‌گرها بسیار مؤثرتر و ایمن‌تر از سموم شیمیایی رایج است (Utkhede et al., 2000). باتوجه به این مسئله، در هر دو شاخص، درصد کاهش مرگ گیاهچه و میزان کاهش شدت بیماری ناشی از تیمار با *P. ultimum* اندازه‌گیری شد تا میزان کارایی این‌نوع عوامل باکتریایی در بیوکنترل و بهبود شاخص‌های رشد در صورت بروز آلودگی در ابتدای فصل و فواصل رشد با هم مقایسه شود. مقایسه میانگین درصد مرگ گیاهچه در گیاهان تحت تیمار با *P. ultimum* نشان داد گیاهان تحت تیمار با سویه

عدم سمیت موتانت‌های حاصل از پرتودهی با پرتوی گاما بر روی میزبان و موجودات مفید در اکوسیستم در گام‌های بعدی انجام شود.

تیمارهای باکتری *B. subtilis* (والد و موتانت) باعث افزایش معنی‌دار پروتئین برگ کاهو شده است؛ اما بیشترین میزان پروتئین در گیاهان تیمار شده با باکتری *A. brasilense* اندازه‌گیری شد؛ و کمترین میزان در گیاهان تیمار شده با باکتری *B. subtilis* پرتو دیده شد. بین تیمار با *B. subtilis* موتانت در شرایط بیماری و بدون بیماری، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.

نتایج اندازه‌گیری میزان محتوای رنگدانه‌ها (کلروفیل و کارتنوئید) نشان داد میزان تجمع رنگدانه‌ها در تیمار با کلیه باکتری‌های *Azospirillum* و *B. subtilis* (والد و موتانت) بالا رفته است؛ اما در تیمار با بیمارگر موتانت‌های *B. subtilis* تفاوت معنی‌داری با شاهد داشتند. یکی از دلایل کاهش بیشتر شدت علائم در ارزیابی‌های گلخانه‌ای در تیمار با موتانت‌های *B. subtilis*، تأثیر فیزیولوژیک این گونه باکتری‌ها در بهبود تجمع رنگدانه‌ها و کاهش زردی گیاهان است.

میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط عدم آلودگی به بیمارگر و تیمار با *B. subtilis* موتانت شش‌صد و *A. lipoferum* بالاتر بود؛ اما با بروز آلودگی، *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده بیشترین تأثیر را در افزایش فعالیت پراکسیداز داشت. سنجش فعالیت آنزیم پلی‌فنل‌اکسیداز نشان داد *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده بیشترین فعالیت را در پی داشته است؛ اما هر دو سویه *Azospirillum* کمترین فعالیت این آنزیم را القاء نمودند. درحالی‌که با بروز بیماری، *B. subtilis* موتانت شش‌صد بیشترین تأثیر را در القاء فعالیت پلی‌فنل‌اکسیداز داشت و با نتایج کاهش شدت بیماری تطابق نشان داد.

سنجش پرولین نیز روند مشابهی از پاسخ فیزیولوژیک گیاهچه‌های کاهو را نشان داد و *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده بیشترین مقدار پرولین را در شرایط عدم تیمار با بیمارگر و بروز بیماری نشان داد؛ هرچند سویه‌های *Azospirillum* نیز قادر به القاء افزایش

آزوسپیریوم تفاوت معنی‌داری با شاهد بیمار نداشت؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت کارایی دو سویه باکتری همزیست *Azospirillum* به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از *B. subtilis* (والد و موتانت) بوده است؛ اما با توجه به پرازاد بودن سویه بیمارگر مورد استفاده در این ارزیابی گلخانه‌ای، درصدی از کاهش بروز علائم در تیمار با باکتری‌های همزیست مشاهده شد که می‌تواند به‌دلیل مکانیسم‌های القاء رشد و بهبود جذب مواد مغذی و القاء مقاومت عمومی در گیاه باشد. در سال‌های اخیر مبحث کنترل بیولوژیکی عوامل بیماری‌زای گیاهی با استفاده از میکروارگانیسم‌های آنتاگونیست به‌ویژه باکتری‌های *B. subtilis* برای کنترل بیماری‌های قارچی و نیز باکتریایی ریشه گیاهان زراعی توجه فراوان شده است.

سویه‌های *B. subtilis* از جمله مهم‌ترین انواع باکتری‌های عامل بیوکنترل محسوب می‌شوند؛ زیرا در بهبود رشد گیاه به‌طور غیرمستقیم؛ و ازسویی دیگر به‌طور مستقیم، از طریق توانایی در حذف عوامل بیماری‌زا از حوزه فعالیت سیستم ریشه‌ای نقش اساسی دارند (Liet al., 2007). سویه آنتاگونیست *B. subtilis* تولید متابولیت‌های ثانویه ضدقارچی و طیف وسیعی از متابولیت‌های میکروبی شامل *Phenazines*، *2,4-diacetylphloroglucinol*، *Pyrolnitrin* و *Pyoluteorin* هستند (Liet al., 2007). گونه *B. subtilis* پیش‌تر به‌عنوان عامل بیوکنترل *P. ultimum* و تعدادی دیگر از بیمارگرهای خاکزاد قارچی و شبه‌قارچی گزارش شده بوده است (Mangmanget al., 2007; Romero et al., 2011; Sartiet al., 2023).

در این مطالعه، کارایی سویه والد و موتانت‌های این باکتری بر روی میزبان کاهو (*Lactuca sativa* L.) برای کنترل مرگ گیاهچه و کاهش شدت بروز علائم بیماری مشاهده شد. براساس نتایج به‌دست آمده از ارزیابی‌ها، کارایی روش القاء جهش در ژنوم *B. subtilis* برای بهبود ویژگی‌های آنتاگونیستی علیه بیمارگرهای گیاهی (حتی جدایه‌های پرازاد) کارآمد است. این روش، دسترسی به موتانت‌های شماره‌های شش‌صد و چهارصدونوزده است که کاندیدهای مناسبی برای مطالعات ارزیابی کارایی بعدی خواهد شد. پیشنهاد می‌شود بررسی‌های ایمنی‌زیستی از نظر

بوته‌میری ناشی از *P. ultimum* باشد. نتایج این تحقیق نشان داد کارایی *B. subtilis* در بیوکنترل بیماری‌گر *P. ultimum* در شرایط گلخانه‌ای بهتر از سویه‌های همزیست *A. lipoferum* و *A. brasilense* بود؛ اما بررسی امکان تلفیق این دو جنس باکتری در خاک برای ایجاد کنسرسیوم زیستی با هدف تقویت گیاه و کنترل بیماری‌گر می‌تواند در بررسی‌های بعدی گنجانده شود. با ایجاد موتانت در *B. subtilis* و بالابردن اثر آنتاگونیستی آن و تولید متابولیت‌های ثانویه ضدقارچی و میکروبی می‌توان به مبارزه بیولوژیکی در آینده امیدوار بود. پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتر و ارزیابی کارایی این موتانت‌ها در گلخانه‌های تجاری و بررسی تثبیت کارایی این موتانت‌ها در خاک، موضوع تحقیقات بعدی باشد. همچنین تأکید می‌شود عدم سمیت موتانت‌های حاصل از پرتودهی با پرتوی گاما بر روی گیاه میزبان و موجودات مفید در اکوسیستم در گام‌های بعدی بررسی شود.

تعارض منافع

هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

تجمع پرولین در شرایط بروز بیماری بودند. در این تیمارها، کاهش شدت بیماری غیرمعنی‌داری که در شاخص بیماری مشاهده شد می‌تواند به دلایل مختلف از جمله افزایش تجمع پرولین باشد. نتایج سنجش مالون‌دی‌آلدئید نیز نتایج سایر شاخص‌های فیزیولوژیکی را تأیید نمود. تیمار گیاه با *B. subtilis* موتانت چهارصدونوزده کمترین مقدار مالون‌دی‌آلدئید را نشان داد که با بیشترین توانایی بیوکنترل بیماری‌گر تطابق داشت.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

براساس نتایج به دست آمده از ارزیابی‌ها، امکان استفاده از روش القاء جهش در ژنوم *B. subtilis* برای بهبود ویژگی‌های آنتاگونیستی علیه بیماری‌گرهای گیاهی متعلق به جنس شبه‌قارچ *P. ultimum* وجود دارد. این روش با ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق القاء جهش، می‌تواند به دسترسی موتانت‌های شش‌صد و چهارصدونوزده بینجامد؛ زیرا بهبود کارایی زیستی آنها در نتایج نخستین ارزیابی گلخانه‌ای تأیید شده و می‌تواند کاندیدهای مناسبی برای استفاده در مدیریت

REFERENCES

- Afsharmanesh, H., Ahmadzadeh, M., Javan-Nikkhah, M., & Behboudi, K. (2014). Improvement in biocontrol activity of *Bacillus subtilis* UTB1 against *Aspergillus flavus* using gamma-irradiation. *Crop Protection*, 60, 83-92. (in Persian).
- Altunkaya, A., et al. (2011). Purification and characterization of polyphenol oxidase, peroxidase and lipoxygenase from freshly cut lettuce (*L. sativa*). *Food Technology and Biotechnology*, 49(2), 249-256.
- Amaradasa, B. S., Mei, C., He, Y., Chretien, R. L., Doss, M., Durham, T., & Lowman, S. (2024). Biocontrol potential of endophytic *Pseudomonas* strain IALR1619 against two *Pythium* species in cucumber and hydroponic lettuce. *Plos one*, 19(2), e0298514.
- Constantinescu, F., Tomescu, A., Şesan, T. E., & Ştirbu, P. M. (2010, July). Biocontrol of Soil Borne Fungi in Tomato Crop by Using Beneficial *Bacillus subtilis* Strains. In *III International Symposium on Tomato Diseases*, 914, 381-384.
- Fatouros, G., Gkizi, D., Fragkogeorgi, G. A., Paplomatas, E. J., & Tjamos, S. E. (2018). Biological control of *Pythium*, *Rhizoctonia* and *Sclerotinia* in lettuce: association of the plant protective activity of the bacterium *Paenibacillus alvei* K165 with the induction of systemic resistance. *Plant pathology*, 67(2), 418-425.
- Li DeQuan, L.D., Nie FengYa, N.F., Wei LiHui, W.L., Wei BenQiang, W.B., & Chen ZhiYi, C.Z. (2007). Screening of high-yielding biocontrol bacterium Bs-916 mutant by ion implantation. *Applied microbiology and biotechnology*, 75, 1401-1408.
- Mangmang, J. S., Deaker, R., & Rogers, G. (2015). Optimal plant growth-promoting concentration of *Azospirillum brasilense* inoculated to cucumber, lettuce and tomato seeds varies between bacterial strains. *Israel Journal of Plant Sciences*, 62(3), 145-152.

- Mohamady, A., Abbas Akhavan Sepahi, A., & Hosseini Doust, S. R. (2017). Biological control of *Pythium ultimum* and *Fusarium solani* by indigenous strains *Bacillus subtilis*. *Journal of Microbial Biology*, 6(21), 1-14. (in Persian).
- Rezalou, Z., Shahbazi, S., Alilou, A. A., & Ghorbani, A. (2023). Biostimulant impact of *Trichoderma* species on physiological characteristics of beans. *Iranian Journal of Genetics & Plant Breeding (IJGPB)*, 12(2). (in Persian).
- Rezalu, Z., et al. (2022). *Investigating the effect of growth-promoting bacteria in stimulating germination and improving the growth components of seeds*. Iran seed science and technology. (in Persian).
- Romero, D., Vlamakis, H., Losick, R., & Kolter, R. (2011). An accessory protein required for anchoring and assembly of amyloid fibres in *B. subtilis* biofilms. *Molecular microbiology*, 80(5), 1155-1168.
- Rostaminia, M., et al. (2021). Effect of three commercial bio-fertilizers prepared with *Pseudomonas* on yield and morphophysiological traits of lettuce (*Lactuca sativa* L.). *Iran Agricultural Research*, 39(2) 99-107. (in Persian).
- Sarti, G. C., Galelli, M. E., Arreghini, S., Cristóbal-Míguez, J. A. E., Curá, J. A., & Paz-González, A. (2023). Inoculation with Biofilm of *Bacillus subtilis* Promotes the Growth of *Lactuca sativa*. *Sustainability*, 15(21), 15406.
- Utkhede, R. S., Lévesque, C. A., & Dinh, D. (2000). *Pythium aphanidermatum* root rot in hydroponically grown lettuce and the effect of chemical and biological agents on its control. *Canadian Journal of Plant Pathology*, 22(2), 138-144.
- Yasari, E., & Patwardhan, A. M. (2007). Effects of (*Azotobacter* and *Azospirillum*) inoculants and chemical fertilizers on growth and productivity of canola (*Brassica napus* L.). *Asian Journal of Plant Sciences*.